

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう かく とう  
**松 鶴 湯 A**  
(漢方製剤)

 使用上の注意



**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

**次の人は服用しないこと**

生後3ヵ月未満の乳児。



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**効能・効果**

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：  
貧血、不眠症、精神不安、神経症

## 用法・用量

本品1包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1日分の1/3量	3 回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量	

食間とは…  
食後2～3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品1包（26.8g）中、下記生薬を含有します。

ニ ン ジ ン	2.4g	ビヤクジュツ	2.4g
ブ ク リ ョ ウ	2.4g	サンソウニン	2.4g
リュウガンニク	2.4g	オ ウ ギ	2.4g
ト ウ キ	1.6g	オ ン シ	1.6g
サ イ コ	2.4g	サ ン シ シ	1.6g
カ ン ソ ウ	0.8g	モ ッ コ ウ	0.8g
タ イ ソ ウ	1.6g	シ ョ ウ キ ョ ウ	0.4g
ポ タ ン ピ	1.6g		

添加物は含有していません。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。
- (2) 本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室  
電 話 03-3843-3833  
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7