この説明書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第２類医薬品

加味逍遙散（かみしょうようさん）エキス〔細粒〕8

71020747

加味逍遙散（かみしょうようさん）はのぼせたり、疲れや肩こりがあって、気持ちに余裕がなく、不安やイライラなどが生じる方の、ぐっすりと眠れないなどの不眠症、生理不順に効果があるほか、生理前や生理中および閉経前後の更年期などにおいて起こる、不安感・いらだち・のぼせ・ホットフラッシュなど、女性ホルモンの乱れによって起こる女性の悩み「血の道症」に効く漢方薬です。

●使用上の注意●

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後３ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

⑴医師の治療を受けている人
⑵妊婦又は妊娠していると思われる人
⑶胃腸の弱い人
⑷高齢者
⑸今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
⑹次の症状のある人　むくみ
⑺次の診断を受けた人　高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

4. １ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症

〔効能・効果に関連する注意〕

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

（裏面につづく）

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
（食間とは食後2～3時間を指します。）

年　齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人（15歳以上）	1 包	2.0ｇ	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.3ｇ	
7歳未満4歳以上	1/2包	1.0ｇ	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.7ｇ	
2歳未満	1/4包	0.5ｇ以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

⑴用法・用量を厳守してください。
⑵小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
⑶1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品３包（6.0ｇ）又は6.0ｇは

トウキ	1.5ｇ	シャクヤク	1.5ｇ
ビャクジュツ	1.5ｇ	ブクリョウ	1.5ｇ
サイコ	1.5ｇ	ボタンピ	1.0ｇ
サンシシ	1.0ｇ	カンゾウ	1.0ｇ
ショウキョウ	0.5ｇ	ハッカ	0.5ｇ

上記より製した加味逍遙散エキス（1/2量）4.6ｇ（乾燥物換算で約2.3ｇに相当）を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

⑴直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
⑵小児の手の届かない所に保管してください。
⑶他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
⑷本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
⑸分包剤で１包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、２日以内に使用してください。
⑹使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社　お客様相談窓口
TEL（052）883-5172　受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
松浦薬業株式会社
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21