

中国の民間説話「白蛇伝」
に登場する女性を伝統的な
漢方のイメージとしてシン
ボルマークとしたものです。

第2類医薬品

漢方製剤

カミセーヌ[®]C 「コタロー」

商品番号

S077

本剤は、漢方の古典「^{わざいまくほう}和剤局方」（宋代）収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

ひと昔前までは「お肌の曲がり角」などという言葉もよく使われたものですが、顔などにこまかいシミなどがあらわれて、それが悩みの種となっている方が少なくありません。またシミだけでなく、湿疹が慢性化して乾燥した状態の場合もあるようです。

これらは、ホルモンバランスの乱れ、あるいは自律神経の失調状態が絡んでいる場合が多く、そのために、生理の不調や肩こり、精神的にイライラしやすいなどの症状を伴うこともあります。

カミセーヌCは、シミに効果を発揮するばかりでなく、女性特有の症状や不定愁訴^{ふていしゅうそ}の改善にも役立つ漢方薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。*

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症*	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。*

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください*

【効能・効果】

体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症：

湿疹・皮膚炎、しみ、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症

(裏面につづく)

〈効能・効果に関連する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	5錠	3回
15歳未満7歳以上	4錠	
7歳未満5歳以上	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】


成分・分量（本剤15錠中）		
トウキ……………1.5g	サイコ……………1.5g	ボタンピ……………1.0g
シャクヤク……………1.5g	センキュウ……………1.5g	サンシシ……………1.0g
ビャクジュツ……………1.5g	ジオウ……………1.5g	ショウキョウ……………0.5g
ブクリョウ……………1.5g	カンゾウ……………0.75g	ハッカ……………0.5g

より抽出した水製エキス3.00gを含有しています。

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメローズ、アメ粉、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

®登録商標

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106