

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

甘草瀉心湯エキス顆粒A

(かんぞうしゃしんとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に記載されている甘草瀉心湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。
むくみ
 - (6)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹がなるものの次の諸症：胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は温湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

【成分・分量】


3包(4.5g)中に甘草瀉心湯エキス1.74gを含有しています。

日局 ハ ン ゲ……………2.50g	日局 オ ウ ゴ ン……………1.25g	} に相当
日局 カ ン キ ヨ ウ……………1.25g	日局 ニ ン シ ン……………1.25g	
日局 カ ン ソ ウ……………1.75g	日局 タ イ ソ ウ……………1.25g	
日局 オ ウ レ ン……………0.50g	添加物として、乳糖、パレイショデンプン	

を含有しています。


保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は吸湿しやすいので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。
ジェーピーエス製薬 お客様相談室
電 話 045-593-2136
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

 **ジェーピーエス製薬株式会社**
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

 **東洋漢方製薬株式会社**
製造販売元 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号