

かんばくたいそうとう  
**甘麦大棗湯エキス〔細粒〕6**

本方は、甘草、小麦、大棗で構成され、甘味があるので小児でも服用し易い薬です。感情が変動しやすく驚きやすい、寝つきが悪い、眠りが浅いなどの特徴があり、夜泣き、また神経過敏や興奮性でひきつけを呈するなどの急迫性の症状を目標とします。

 ● 使用上の注意 ●

本剤は小児用ですが、甘麦大棗湯として定められた一般的な注意事項を記載しています。

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

生後3ヵ月未満の乳児



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)次の症状のある人   むくみ
- (5)次の診断を受けた人   高血圧、心臓病、腎臓病

**2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けてください。**

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

**3. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

● 効能・効果 ●

体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るものの次の諸症：

不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ

## ●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
7才未満4才以上	1 包	2.0g	3 回
4才未満2才以上	2/3包	1.3g	
2才未満	1/2包	1.0g以下	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)7才未満の小児に限って服用させてください。
- (3)服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

〔カンゾウ……………2.5g ショウバク……………10.0g〕  
〔タイソウ……………3.0g〕

上記より製した甘麦大棗湯エキス2.6g(乾燥物換算で約1.3gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、パレイシヨデンポン、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21