


販売名：ジキニンのどクリア

### 使用上の注意

相談すること **1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(4) 高齢者。(5) 次の症状のある人。むくみ(6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病 **2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**●消化器：食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 **3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。** **4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**効能・効果** 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

# ジキニン® のどクリア



## 扁桃炎・扁桃周囲炎に

製造販売元

**全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>

全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

<月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)>

# 30mL

## 第2類医薬品

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

**成分(1日量3びん90mL中)** 桔梗湯抽出液81mL〔キキョウ2g、カンゾウ(甘草)3gより抽出。〕

添加物としてアルコール、パラベン、香料、白糖を含有します。

**用法・用量** 大人(15才以上)1回1びん(30mL)を1日3回食前又は食間に、よく振ってから、ひと息に飲まず、うがいしながら服用してください。

○生薬エキスを使用していますので、沈殿が生じますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。(4) キャップの切り口で手指等を切らないように注意してください。

3-1

使用  
期限  
(年、月)

製造  
番号