

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

販売名：プラチコプラス顆粒

第 2 類医薬品

【成分・分量】 1日量 3包(3.0g)中

(カンゾウ2.0g・キキョウ1.3g) 桔梗湯エキス0.95g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプン含有する。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

【用法・用量】 次の量を食前又は食間[※]に、少しずつ口中に含み、水又はぬるま湯で徐々に溶かして服用してください。

※[食間]とは食後 2～3 時間を指します。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満 7歳以上	2 / 3 包	
7歳未満 4歳以上	1 / 2 包	
4 歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【効能・効果】 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

発売元
株式会社エナジー

〒965-0835 福島県会津若松市館馬町8-8
問合せ先：0242-85-7380

製造販売元
剂盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目 8 番31号

製造番号

使用期限

開封口

1.0g × 30 包
漢方薬

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。(4)高齢者。(5)次の症状のある人。むくみ
(6)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6 回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

