

第2類医薬品

のどの痛み・はれ、扁桃炎に

き きょう とう
桔梗湯

クラシエの漢方

内服液



き きょう

桔 梗 湯

〈効能〉

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

〈用法・用量〉

成人（15才以上）1回1本、1日3回、食前又は食間によく振ってから、ひと息に飲まず、うがいしながら服用してください。15才未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

〈成分〉

成人1日の服用量90mL
 (30mL×3本)中
 桔梗湯抽出液……………81mL
 [キキョウ 2g、カンゾウ 3g]より抽出。
 添加物として、パラベン、白糖を含有する。

副作用被害救済制度の問合せ先
 ☎0120-149-931

押して開ける

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：クラシエ桔梗湯内服液

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の症状のある人 むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人
 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。
 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱及びピンラベルに記載)のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) ピンをあけたら飲みきってください。
- (6) ピンをあけたまま保存しないでください。

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
 東京都港区海岸3-20-20
 ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
 受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**
 奈良県高市郡高取町清水谷1269