

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

東洋の桔梗湯エキス顆粒S

(ききょうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている桔梗湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

[用法・用量]

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回	7才未満 4才以上	1/2包	3回
15才未満 7才以上	2/3包		4才未満 2才以上	1/3包	
			2才未満	服用しないこと	

上記の量を、食前又は食間に少しづつ口中に含み、水又は白湯で徐々に溶かして服用して下さい。

[用法・用量に関連する注意]

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量3包(1包1.5g)中]

日本薬局方 キ キ ヨ ウ……2.0g

日本薬局方 カ ン ソ ウ……3.0g

より製した水製乾燥エキス………1.25g

添加物として、乳糖、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電 話 0120-149-931

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号