

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、
服用の際には必ずお読みください。

東洋の桔梗湯エキス顆粒S

(ききょうとう)

漢方製剤 第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に収載されている桔梗湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
(4)高齢者。
(5)次の症状のある人。：むくみ
(6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

【用法・用量】

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15才以上)	1 包	3 回
15才未満 7 才以上	2/3包	
7 才未満 4 才以上	1/2包	
4 才未満 2 才以上	1/3包	
2 才未満	服用しないこと	

上記の量を、食前又は食間に少しづつ口中に含み、水又は白湯で徐々に溶かして服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 [本品 1 日量 3 包(1 包 1.5g)中]

日本薬局方 キ キ ヨ ウ……2.0g 日本薬局方 カ ン ソ ウ……3.0g
より製した水製乾燥エキス………1.25g
添加物として、乳糖、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mgを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 本剤は吸湿しやすいので、1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1 日以内に服用してください。(開封状態で置いておくと顆粒が変色することがあります。変色した場合は、服用しないでください。)
- 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なる場合がありますが、効能・効果には変わりありません。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。
ジェーピーエス製薬 お客様相談室
電 話 045-593-2136
受付時間 9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ジェーピーエス製薬株式会社

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

東洋漢方製薬株式会社

製造販売元 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号