

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

# コエキュア

第2類医薬品

漢方製剤

販売名：コエキュア

## 特徴

- 早く治したい声がれ、のどの不快感を改善する医薬品です
- 漢方処方“響声破笛丸”（きょうせいはいてきがん）が、のどの奥の声帯の炎症を鎮め、声を出しやすくしていきます

## ⚠ 使用上の注意

 **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 高齢者
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人  
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、げげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
軟便、下痢

（裏面につづく）

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

しわがれ声、咽喉不快

注) 体力に関わらず、使用できる

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回
7才以上15才未満	2/3包	
7才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守すること

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

● 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 成分・分量

 1日量(3包:6.0g)中

響声破笛丸料エキス…3.5g

レンギョウ	2.5g	キキョウ	2.5g	カンゾウ	2.5g
ダイオウ	1.0g	シュクシャ	1.0g	センキュウ	1.0g
カシ	1.0g	アセンヤク	2.0g	ハッカ	4.0g

より抽出

添加物として、セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、プロピレングリコール、l-メントール、スクラロース、乳糖を含有する

● 本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

(2) 小児の手の届かない所に保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること  
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

**0120-5884-01**

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3