

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

きょうせいは てきがんりょう 響声破笛丸料エキス顆粒KM

漢方製剤 ごしわがれ声・のどの不快感～ 満量処方

響声破笛丸料エキス顆粒KMは、古くから中国に伝わる漢方処方「響声破笛丸」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。普段からのどが弱かったり、声の出しすぎや歌いすぎなどのどの調子が悪く、しわがれ声やのどに不快感があるときによく効きます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けすること

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|---------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状 |
|--------------------|---|
| 偽アルドステロン症 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
　　軟便、下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

しわがれ声、咽喉不快

<効能・効果に関連する注意>

○体力に關わらず、使用できる。

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食前又は食間に、水又はぬるま湯で服用する。

| 年齢 | 成人(15才以上) | 7才以上 15才未満 | 4才以上 7才未満 | 2才以上 4才未満 | 2才未満 |
|-----|-----------|---------------|--------------|--------------|------|
| 1回量 | 1包 | 2/3包 | 1/2包 | 1/3包 | 1/4包 |

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

【成分・分量】

3包(成人1日量:7.5g)中

| | | | | | |
|---------------|-------|--------|-------|------|-------|
| 響声破笛丸料水製乾燥エキス | | 3.50 g | | | |
| (ハツカ) | 4.0 g | レンギョウ | 2.5 g | キキョウ | 2.5 g |
| カンゾウ | 2.5 g | アセンヤク | 2.0 g | ダイオウ | 1.0 g |
| シュクシャ | 1.0 g | センキュウ | 1.0 g | カシ | 1.0 g |
| より製した乾燥エキス | | | | | |

添加物：乳糖、白糖、ステアリン酸Mg、ケイヒ油、メントールを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わること)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011 受付時間9:00～16:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

北日本製薬株式会社

富山県中新川郡上市町若杉55

C-01