

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

13

錠剤 きゅう ききょうがいとう 芎歸膠艾湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位（痔出血に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症：
痔出血、貧血、月経異常・月経過多・不正出血、皮下出血

〔用法・用量〕

食間又は空腹時に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

自社製別紙規格

日局	センキュウ末	2.50g	日局	センキュウ	3.0g	別水 紙性 工 規 主 格 ス
日局	カンゾウ末	2.50g	日局	カンゾウ	3.0g	
日局	トウキ末	3.75g	日局	トウキ	4.5g	
日局	シャクヤク末	3.75g	日局	シャクヤク	4.5g	
局外生規	ジオウ末	5.00g	日局	ジオウ	6.0g	
別紙規格	ガイヨウ末	2.50g	局外生規	ガイヨウ	3.0g	
別紙規格	アキョウ末	2.50g	局外生規	アキョウ	3.0g	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10