

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋漢方の 芍 帰 膠 艾 湯 エキス 顆 粒

(ぎゅうぎきょうがいとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に記載されている芍帰膠艾湯に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4)高齢者。
 - (5)次の症状のある人。：むくみ
 - (6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止しこの文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

痔出血

[用法・用量]

下記の量を食前又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3.0g	3回
15才未満	服用しないこと	

[用法・用量に関連する注意]

用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量9.0g中]

日本薬局方 センキュウ	3.0g	日本薬局方 シャクヤク	4.0g
日本薬局方 カンゾウ	3.0g	日本薬局方 ジョウ	6.0g
日本薬局方 ガイヨウ	3.0g	日本薬局方 ゼラチン	3.0g
日本薬局方 トウキ	4.0g	より製した水製乾燥エキス	4.44g
		添加物として、乳糖、パレイシヨデンプンを含む。	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
- (4)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0120-00-1040
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号