

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋漢方の芎帰膠艾湯

(きゅうききょうがいとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に収載されている芎帰膠艾湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。 (4)高齢者。
 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。 (5)次の症状のある人。：むくみ
 (3)胃腸が弱く下痢しやすい人。 (6)次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

痔出血。

[用法・用量]

大人（15才以上）は1包（1日量）を和紙袋入りのまま、水500mLを加え、半量位まで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、食間に温服して下さい。小児（15才未満2才以上）は同様に煎じ、下記の量を食間に服用して下さい。

年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数	年 齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人（15才以上）	全 量	3回に分けて	7才未満 4才以上	1/2量	3回に分けて
15才未満 7才以上	2/3量		4才未満 2才以上	1/3量	
		2才未満		服用しないこと	

[用法・用量に関する注意]

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品 1包(1日量) 26.0 g 中]

日本薬局方 センキウ	3.0 g	日本薬局方 シヤクヤク	4.0 g
日本薬局方 カンゾウ	3.0 g	日本薬局方 ジオウ	6.0 g
日本薬局方 ガイヨウ	3.0 g	日本薬局方 ゼラチン	3.0 g
日本薬局方 トウキ	4.0 g		


保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保存すること。

(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。

(3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

(4) 煎じ葉は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお問い合わせ下さい。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号