

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。(5)高齢者。(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。むくみ(8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、 つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】1日量(3本(90mL))中

驅風解毒湯エキス……10.0g

日局ポウフウ… 3.0g	日局ゴボウシ… 3.0g
日局レンギョウ 5.0g	日局ケイガイ… 1.5g
日局キョウカツ 1.5g	日局カンゾウ… 1.5g
日局キキョウ… 3.0g	日局セッコウ… 5.0g

に相当

添加物：白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール

【効能・効果】体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むもの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

【用法・用量】成人(15才以上)1回1本、1日3回食前又は食間に含嗽しながらゆっくり服用してください。(15才未満は服用しないでください。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。
- (3)本剤は本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)封をあげたら飲みきってください。封をあげたまま保存しないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
 発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22
 お客様相談室 ☎ 0 4 5 (5 9 3) 2 1 3 6