

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

漢方製剤

第2類医薬品

ニットー 駆風解毒湯 エキス顆粒

ク フウ ゲ ドクトウ
駆風解毒湯は、数ある漢方処方のうちでも代表的なものの一つで、のどがはれて痛む扁桃炎や扁桃周囲炎に効果がある漢方薬です。

ニットー駆風解毒湯エキス顆粒は駆風解毒湯をエキス化し、顆粒としたものでのみやすく、有効成分が直接のどに作用するように水または温湯に溶かし、少量を口に含み、うがいをしながら少しづつゆっくり服用するのが特長です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 高齢者
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人
　　むくみ
- (8) 次の診断を受けた人
　　高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

- 3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：
扁桃炎、扁桃周囲炎

用法・用量

次の量を食前又は食間に、1包につきコップ約半量の水又は温湯に溶かし、熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)本剤は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり服用してください
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分・分量

成人1日量(3包)中に次の成分を含んでいます

成 分 (含 量)
驅風解毒湯エキス(5.1g) 〔ボウフウ (3.0g) キョウカツ (1.5g) ゴボウシ (3.0g) カンゾウ (1.5g) レンギョウ (5.0g) キキョウ (3.0g) ケイガイ (1.5g) セッコウ (10.0g) より得たエキス

添加物として、D-マンニトール、L-メントール、香料を含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話:(03)3370-7174(代表)
受付時間:午前9:00から午後5:00まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3