

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

けいがいれんぎょうとう

荊芥連翹湯エキス顆粒KM

漢方製剤 ～蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎に～ 満量処方

荊芥連翹湯エキス顆粒KMは、蓄膿症や慢性鼻炎、扁桃炎、にきびなどに効きます。体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒い方に向いています。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。

【成分・分量】

1日量3包（1包3.0g）中

荊芥連翹湯水製乾燥エキス	4.75g				
キキョウ	2.0g	サイコ	2.0g	ピャクシ	2.0g
オウゴン	1.5g	オウバク	1.5g	オウレン	1.5g
カンゾウ	1.5g	キシツ	1.5g	ケイガイ	1.5g
サンシシ	1.5g	ジオウ	1.5g	シャクヤク	1.5g
センキュウ	1.5g	トウキ	1.5g	ハッカ	1.5g
ポウフウ	1.5g	レンギョウ	1.5g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖、ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがありますが、薬効には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。
 北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
 電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）