

## 第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



## 漢方製剤 JPS 桂枝加芍薬湯エキス錠N

桂枝加芍薬湯は比較的体力がなく、腹部膨満感がある方のしぶり腹、腹痛、下痢、便秘を改善します。体を温めてお腹の緊張をやわらげ、胃腸機能をとのえる働きがあります。

本剤は漢方処方である桂枝加芍薬湯の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。



### 使用上の注意



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

#### 3. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〔効能・効果〕

体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症：しぶり腹、腹痛、下痢、便秘

〈効能・効果に関連する注意〉

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことです。

### 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

### 〔成分・分量〕

12錠中

桂枝加芍薬湯乾燥エキス散2.88gを含有しています。

日局ケ イ ヒ…………… 2.4 g	日局ショウキョウ…………… 0.6 g
日局タイソウ…………… 2.4 g	日局カンゾウ…………… 1.2 g
日局シャクヤク…………… 3.6 g	

上記生薬量に相当します

添加物として、二酸化ケイ素、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有しています。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5)本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。  
ジェーピーエス製薬 お客様相談室  
電 話 045-593-2136  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22