

けいしぶくりょうがんりょう

桂枝茯苓丸料 A エキス細粒「分包」 三和生薬

桂枝茯苓丸料 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「桂枝茯苓丸」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 3包（1包1.5 g）中
桂枝茯苓丸エキス …………… 2.6 g

ケ イ ヒ …………… 4 g	トウニン …………… 4 g
ブクリョウ …………… 4 g	シャクヤク …………… 4 g
ボタンビ …………… 4 g	
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770
10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

適応症

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

〈適応症に関連する注意〉

注)：血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

第2類医薬品

桂枝茯苓丸Aエキス細粒
〔分包装〕三和生薬

桂枝茯苓丸Aエキス細粒〔分包装〕三和生薬は、漢方処方「桂枝茯苓丸」の生薬エキスを服用しやすい細粒の分包装したものです。

使用上の注意

■相対すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疽(皮膚や白目が黄色くなる)、尿色茶、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷などを訴えるものの次の症状：
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の滞り、肩こり、めまい、頭痛、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

〈適応症に関連する注意〉

注：血の滞りとは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

ご使用に際しては、説明文を必ずお読み下さい。
また、必要な時に認めるように保管して下さい。

開封口

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
7才～14才	2/3包
4才～6才	1/2包
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分

本品1日量………3包(1包1.5g)中

桂枝茯苓丸エキス………2.6g

ケイヒョウ………4g
フクヨウ………4g
ボクランビ………4g
トクニン………4g
シヤクヤク………4g
上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファ化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 湿気の容器に入れ替えないこと。(4) 服用の原因により品質が変わる。(4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

消費者くすり相談室 電話 0570-095770
10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用報告救済制度 電話 0120-149-931

製造番号

使用期限

製造販売元



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1



月経不順、
月経痛、更年期障害、肩こり、めまいに

桂枝茯苓丸
けいしぶくりようがん

15包
(5日分)

第2類医薬品

10COINSKAMPO

けいしぶくりようがん
桂枝茯苓丸

15包

第2類医薬品


MA

桂枝茯苓丸
けいしぶくりようがん

細粒
タイプ

15包
(5日分)

第2類医薬品



10COINSKAMPO

15包(5日分) 第2類医薬品



4 987327 084677