



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

モリビーシャン

(桂枝茯苓丸エキス製剤)

特 徴

モリ ビーシャンは、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、顔色のよい比較的体力のある人で、ときどき下腹が痛んだり、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷え(冷えのぼせ)を訴える方に適していて、血のめぐりをよくし、月経不順、月経痛、更年期障害などの症状や湿疹・皮膚炎、にきびに効きめがあります。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

<用法及び用量に関連する注意>
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量	
本剤3包(1包1.5g)中に、次の生薬から抽出された桂枝茯苓丸エキス2.0gが含まれています。	
ケイヒ(桂皮)……………4g	トウニン(桃仁)……………4g
ブクリョウ(茯苓)……………4g	シャクヤク(芍薬)……………4g
ポタンピ(牡丹皮)……………4g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

- 保管及び取扱い上の注意**

 - (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
 - (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

効能又は効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

<効能又は効果に関連する注意>

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
電話(06)6629-9058
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2