

平成24年11月1日改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

## 漢方製剤

第2類医薬品

# 桂枝茯苓丸

桂枝茯苓丸は、ケイヒ、ブクリョウ、ボタンピ、トウニン、シャクヤクを配合した漢方製剤(婦人薬)です。



## 使用上の注意



### [相談すること]

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症<sup>(注)</sup>、肩こり、めまい、頭痛、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ

<効能又は効果に関する注意>

(注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴ってあらわれる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

## 用法・容量

次の量を、食間あるいは食前の空腹時に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人 (15歳以上)	20粒	3回

## 成分・分量(1日量:7320mg(60粒))中

はたらき	成 分	含 量
末梢の血行をよくし体を温める	ケイヒ	900mg
利尿、強心	ブクリョウ	900mg
うつ血をとり消炎、鎮静	ボタンピ	900mg
	トウニン	900mg
腹直筋の緊張をほぐす	シャクヤク	900mg

※ 添加物として、デヒドロ酢酸ナトリウム、ハチミツ、米粉、精製セラック、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質がかわります)

## お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

電話:076-431-7017 FAX:076-431-7013

受付時間:午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元:株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3