

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

漢 方 薬
ちょう けつ がん ®
オオクサ 調 血 丸

特 徴

- オオクサ調血丸は漢方薬「桂枝茯苓丸」（けいしづくくりょうがん）に緩下剤の大黄を加えた独自の処方です。
- 比較的体力のある方の月経不順や月経困難症、更年期障害に伴うのぼせや動悸などに効果があります。
- 女性だけではなく、男性の打撲症にも用いられます。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の医薬品を服用している人。瀉下薬（下剤）
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

○月経不順、月経困難症、打撲症、更年期の神経症・更年期障害に伴うのぼせ・動悸



用法・用量

次の量を、食前又は空腹時に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	20~30丸 (1~1.5包)	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量

100丸(5包)中

成 分	含 量	成 分	含 量
ケイヒ末(桂皮末)	2.0 g	ブクリョウ末(茯苓末)	2.0 g
ボタンピ末(牡丹皮末)	2.0 g	トウニン末(桃仁末)	2.0 g
シャクヤク末(芍薬末)	2.0 g	ダイオウ末(大黄末)	0.5 g

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



包 装 60包 1600丸

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

大草薬品株式会社 「お客様相談係」

電話：046-834-1193 [月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

発売元

大草薬品販売株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15

製造販売元

大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15