

漢方薬

オオクサ 桂枝茯苓丸料エキス錠

特徴

- 漢方薬「桂枝茯苓丸」(けいしぶくりょうがん)は、^{おけつ}瘀血(下腹部に抵抗や圧痛を認める)を除く処方としてよく用いられており、月経不順や月経痛、更年期障害など女性特有の症状に良く効きます。
- 女性だけではなく、比較的体力がある男性の肩こり、めまい、頭重にも使用されます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症[※]、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

< 効能に関連する注意 >

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。



月経不順



更年期障害



頭重、めまい

用法・用量

次の量を、食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

15錠(成人の1日服用量)中、次の成分及び分量からなる桂枝茯苓丸エキス(2/3量)1870mgを含んでいます。

成分	分量
ケイヒ(桂皮)	2.67 g
ブクリョウ(茯苓)	2.67 g
ボタンピ(牡丹皮)	2.67 g
トウニン(桃仁)	2.67 g
シャクヤク(芍薬)	2.67 g

添加物としてバレイシヨデンブン、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



その他の注意

- (1) 天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

包装 280錠

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15