

この添付文書はご使用前に必ずお読みください。 また、必要時に読めるよう保管しておいてください。

## 漢方製剤 第2類医薬品

# 花扇桂枝茯苓丸 (はなおうぎ けいしぶくりょうがん)

花扇桂枝茯苓丸は漢方の伝統処方に基づいて生薬をそのまま粉末にして丸剤にしたものです。本品の処方漢方の古典「金匱要略」(きんきようりやく)に基づいております。



### 使用上の注意

定められた用法・用量をお守りください



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。・・・下痢
- 1か月位服用しても症状がよくなる場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 成分および分量

本剤は、茶色の丸剤で、1日量90丸（約9g）中に次の成分を含有しています。

ケイヒ末 1g、ブクリョウ末 1g、ボタンピ末 1g、トウニン末 1g、シャクヤク末 1g

添加物：トウモロコシデンプン、ハチミツ、アラビアゴム末、セラック

## 効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ

（血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことを言います）

## 用法・用量

大人（15歳以上）は1回30丸（約3g）を1日3回食前または食間に服用します。（食間とは・・・食後2～3時間を指します。）

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 開封後は、しっかりと封をして保管してください。

**<お問い合わせ先>** 小西製薬株式会社 お客様相談窓口  
〒579-8012 大阪府東大阪市上石切町 2-33-11  
電話番号 072-981-2429  
受付時間 月～金曜日 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

製造販売元 **小西製薬株式会社**  
〒579-8012 大阪府東大阪市上石切町 2-33-11