

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のぼせ、足冷えがある方の月経異常、しみに
けいしぶくりょうがん

DHC 漢方 桂枝茯苓丸エキス錠

<一般用漢方製剤>

第2類医薬品

DHC漢方桂枝茯苓丸エキス錠は、中国の古典医学書^{きんきようりやく}「金匱要略」に記載されている桂枝茯苓丸のエキスを服用しやすい錠剤にした漢方薬です。比較的体力があり、ときに下腹部が痛み、のぼせて足が冷える方の月経異常、更年期障害、しみに、きびなどに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください。

■ 効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

【効能・効果に関連する注意】

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

■ 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	6錠	1日3回
7才以上15才未満	4錠	
5才以上7才未満	3錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

18錠(成人1日量)中

下記の成分及び分量からなる桂枝茯苓丸エキス(1/2量)950mgを含有します。

成分	分量
ケイヒ	2.0g
シャクヤク	2.0g
トウニン	2.0g
ブクリョウ	2.0g
ポタンピ	2.0g

添加物として、カルメロースCa、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

【成分に関連する注意】

本剤は生薬を用いていますので、錠剤の色調が異なることがあります。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。
6. 本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp