

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

けいしぶくりょうがん そうしせい
桂枝茯苓丸錠「創至聖」

漢方製剤

桂枝茯苓丸錠「創至聖」は、古くから中国に伝わる漢方処方「桂枝茯苓丸」を飲みやすくした錠剤です。
比較的体力があり、のぼせや足が冷たい方の月経痛や肩こり、更年期障害、しみなどに効果があります。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

〈効能・効果に関連する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことである。

【用法・用量】

次の量を食前または食間に水または白湯で服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後

〈用法及び用量に関連する注意〉

5才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】

1日量(12錠)中

成 分	
ケイヒ末	600mg
ブクリヨウ末	600mg
ボタンピ末	600mg
トウニン末	600mg
シャクヤク末	600mg

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、セルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)を含有

本剤は天然物(生薬)を用いているので、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- ぬれた手で本剤に触れないこと。(水分が錠剤につくと、変色の原因になる。)



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011 受付時間9:00~16:30(土、日、祝日を除く)