

漢方製剤

第2類医薬品

けい し ぶくりょうがんりょうかよくい にん
桂枝茯苓丸料加薏苡仁
エキス〔細粒〕96

本方は、桂枝茯苓丸に薏苡仁を加えた処方で、桂枝茯苓丸の適応症であるのぼせや下半身の冷えなどがある人の月経不順や血の道症の症状に加え、にきびや手足のあれ等、皮膚の異常疾患のある人に用います。

 ● 使用上の注意 ●



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。 生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症

〔効能・効果に関連する注意〕

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

（裏面につづく）

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15才以上)	1 包	3 回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)中に次の成分を含んでいます。

ケイヒ	2.0g	ブクリョウ	2.0g
シャクヤク	2.0g	ボタンピ	2.0g
トウニン	2.0g	ヨクイニン	5.0g

上記の桂枝茯苓丸料加薏苡仁水製エキス2.7g(乾燥物換算で約1.35gに相当)を含有します。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、パレイショデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

三宝製薬株式会社 お客様相談室

電話03-3952-0100 月～金曜日 9:00～17:00(祝祭日を除く)



発売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18



製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町寅新田36