

キミエホワイト 漢方

第2類医薬品

開封口

漢方とは？

中国から伝来した医療理論をもとに、日本の風土や日本人にあうように日本独自に発展したものです。

漢方薬は、植物や動物など、自然にあるものを乾燥し生薬として組み合わせ処方されており、検査しても原因がわからないイライラや怠さ、更年期の症状などの不定愁訴にも効果を発揮するものもあります。また、症状だけでなく体の状態によっても選択肢が変わるのも漢方薬の特徴です。

ケイシブクリョウガンリョウカクイニン
桂枝茯苓丸料加薏苡仁とは？

桂枝茯苓丸料加薏苡仁は、漢方の婦人薬での三大処方の一つである“桂枝茯苓丸”に“薏苡仁”^{ヨクイニン}が加わった漢方処方、足元は冷えているのに上半身は火照るような方に向いているお薬です。

さらにヨクイニンを加えたことで、しみやニキビにも効果が期待できます。

服用に際して、箱の説明書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬グループ
医薬品相談窓口
☎0120-432-093
受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 株式会社富山常備薬グループ
富山県富山市丸の内1-8-17

製造販売元 OJAS PHARMA株式会社
奈良県五條市住川町1321

TY-1

第2類医薬品

漢方 キミエホワイト KIMIE WHITE

しみに
飲んで効く

31日分 248錠

ケイヒ・ブクリョウ・ボタンピ
トウニン・シャクヤク・ヨクイニン

富山常備薬グループ

開封年月日

開封時に記入してください。

ビンの中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。開封時に捨ててください。

第2類医薬品

販売名:漢方キミエホワイト

内容量:248錠(1日8錠 31日分)

成分・分量 1日量:8錠中

●桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス………1830mg
(ケイヒ、ブクリョウ、ボタンピ、トウニン、シャクヤク各2.0g、ヨクイニン5.0gより抽出)

添加物として、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、カルメロースカルシウム、カルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、結晶セルロースを含む。

効能・効果

●比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:にきび、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、月経不順、血の道症

【効能・効果に関連する注意】

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	2回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



台墨京福

副嶺出華