

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。 また必要な時に読めるように大切に保管してください。



中国の民間説話「白蛇伝」 に登場する女性を伝統的な 漢方のイメージとしてシン ボルマークとしたものです。



商品番号 D108

エキス細粒G「コタロー」

甲字湯は、江戸時代後期の水戸藩侍医の原南陽が創った「瘀血を理する」(滞った血流を改善する)処方で、桂枝茯苓丸に、胃の働きを整えるとされる甘草と生姜を加えた漢方薬です。瘀血による諸症状、血の道症、生理不順、のぼせやすく足は逆に冷える、打ち身があざになりやすいという方に用います。

**甲字湯エキス細粒G「コタロー」**は、比較的体力がある方で、生理が不順でつらい方、打撲すると内出血を起こす方、のぼせて足が冷え、肩こり、頭痛を訴える方に効果があります。



## 使用上の注意



# してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) **次の人は服用しないでください** 

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4)高齢者。
  - (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (6)次の症状のある人。 むくみ
  - (7)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師また は登録販売者に相談してください

関係部位	症    状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直 ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症	状
	手足のだるさ、	しびれ、つっぱり感やこ
偽アルドステロン症、	わばりに加えて	て、脱力感、筋肉痛があら
ミオパチー	われ、徐々に強	強くなる。

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください下痢
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この 文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足 冷えなどを訴えるものの次の諸症:

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、打ち身(打 撲症)、めまい、頭重、しみ、しもやけ

〈効能・効果に関連する注意〉

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状

#### 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。 食間とは……食後2~3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包 または 1.0g	
15歳未満7歳以上	2/3包 または 0.7g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 0.5g	3回
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.3g	
2歳未満	1/4包 または 0.2g	

(大入り剤に添付のサジは、すり切り一杯で約0.6gです)

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてく ださい。
- (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを 得ない場合にのみ服用させてください。

#### 【成分・分量】

成分·分量 本剤3包(3.0g)中

ケイヒ …… 3.2g トウニン……3.2g カンゾウ ……1.2g ブクリョウ ······ 3.2g シャクヤク……3.2g ショウキョウ … 0.6g ボタンピ ...... 3.2g

より抽出した水製エキス1.8gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、アメ粉を含 有しています。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して ください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤っ て水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。 (5) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り
- 返して保管し、2日以内に服用してください。 (分包剤のみ)
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用 後は、ビンのフタをよくしめてください。

(大入り剤のみ)

- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- ンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を 入してください。

(大入り剤のみ)



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることが ありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、 職業・電話番号、症状をお書きそえのうえ、 お申込みをださい。漢 カケットでは、 明した、パンフレットを お送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



# 小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106