

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 香蘇散

コウソサン

ウチダの香蘇散は漢方処方にしたがって、生薬を配合して製した散剂で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（かぜの初期に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品9.5g中	
コウブシ	4.0g
ソヨウ	1.0g
カンゾウ	1.0g
チンピ	2.5g
ショウキョウ	1.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

神経質で気分がふさぎ、みぞおちがつかえ、倦怠感、食欲不振などがあるもので、肩こり、頭重、頭痛、めまい、耳鳴、腹痛、悪心などを伴うもの。

胃腸の弱い人の感冒、気鬱^注、蕁麻疹、神経性月経困難症。

注）「気鬱^{まうつ}」とは気のうっけつを指します。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前1時間または食間空腹時に水または温湯で服用する。

年齢	1回量
大人（15才以上）	2.0g
15才未満 12才迄	1.6g
12才未満 7才迄	1.4g
7才未満 5才迄	1.0g
5才未満 2才迄	0.6g
2才未満	0.3g

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 添付の匙はすり切りで、大匙1杯が約1g、小匙1杯が約0.1gです。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 新潟県上越市大湯区蜘蛛池 1755-3