

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の香蘇散料エキス顆粒

(こうそさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、中国の宋時代(約1000年前)の古典「太平惠民和劑局方」に収載されている香蘇散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期

[用法・用量]

下記の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

なお、用時添付のサジ(すり切り1.0g)を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1.50g	3回	7才未満4才以上	0.75g	3回
15才未満7才以上	1.00g		4才未満2才以上	0.50g	
			2才未満	服用しないこと	

[用法・用量に関連する注意]

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量4.5g中]

日本薬局方 コウブシ	1.05g	日本薬局方 コウブシ末	1.4g
日本薬局方 ソヨウ	0.45g	別紙規格 ソヨウ末	0.6g
日本薬局方 チンピ	0.90g	別紙規格 チンピ末	1.2g
日本薬局方 カンゾウ	0.30g	日本薬局方 カンゾウ末	0.4g
日本薬局方 ショウキョウ	0.30g	日本薬局方 ショウキョウ末	0.4g
より製した水製乾燥エキス	0.5g		

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。

(4) 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号