

知っておきたい

商品特長

- 夜、昼何度もトイレに行きたくなる「頻尿」を改善する効果があります。
- 尿のキレの悪さや、尿が出渋るなどの「排尿困難」を改善します。
- エキスの抽出方法にこだわっています。

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

漢方製剤

この外箱は、本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：
 下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

●まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】 次の量を1日2回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

成人（15才以上）…1回4錠 15才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。

（用法・用量に関連する注意）用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 8錠中 牛車腎気丸エキス（1/2量）2400mg（ジオウ2.5g、サンシュユ1.5g、サンヤク1.5g、タクシャ1.5g、ブクリョウ1.5g、ボタンビ1.5g、ゴジツ1.5g、シャゼンシ1.5g、ケイヒ0.5g、ブシ末0.5gより抽出）を含む。添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む。

※本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

発売元：〇ト製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク：06-6758-1230

製造販売元：大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地

使用
期限

製造
番号

体質研究から生まれた

和漢

わかんせん

箋

「和漢箋」は、

体の内部機能に着目した

漢方薬シリーズです。

お客さま安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。
 東京：03-5442-6020
 大阪：06-6758-1230
 受付時間 9:00～18:00
 （土、祝日を除く）

詳しい情報はHPで！

www.wakansen.com

1日2回

1回4錠



錠
日分

第2類医薬品

夜中に何度もトイレに行く、
尿のキレが悪いなどの尿トラブルに効く

体質研究から生まれた【医薬品】

和漢

わかんせん

箋

冷えやすい方…

✓ 昼夜の頻尿

✓ 排尿困難（尿が出渋るなど）

〈販売名〉 〇ト牛車腎気丸錠 II

ごしゃんきかんじょう

〇ト製薬