



2014年1月改訂 記載要領変更に伴う改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

## ウロバランス

(牛車腎気丸エキス製剤)

ウロバランスは…

ゴシャジンキガン

10種類の生薬から成る漢方処方「牛車腎気丸」のエキスを飲みやすい細粒にした製剤です。「牛車腎気丸」は中国の医書「済生方」に記載されている漢方処方です。疲れやすく、手足が冷えやすく、尿量が少なく、むくみがある方の症状に効果をあらわします。(牛車腎気丸は、八味地黄丸にゴシツとシャゼンシを加えた処方です。)

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください  
生後3ヵ月未満の乳児。



#### ■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



| 関係部位  | 症 状             |
|-------|-----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ       |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛   |
| そ の 他 | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状  |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



## 〔効 能〕

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

## 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を、食前又は食間に服用してください。

| 年 齢       | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|-------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包    | 3回     |
| 7～14才     | 2/3包  |        |
| 4～6才      | 1/2包  |        |
| 2～3才      | 1/3包  |        |
| 2才未満      | 1/4包  |        |

（食間とは食後2～3時間を指します。）

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 〔成分・分量〕3包中（1包2g）

|                |      |
|----------------|------|
| 牛車腎気丸エキス（1/2量） | 7.0g |
| ジオウ            | 2.5g |
| サンシュユ          | 1.5g |
| サンヤク           | 1.5g |
| タクシャ           | 1.5g |
| ブクリョウ          | 1.5g |
| ポタンピ           | 1.5g |
| ケイヒ            | 0.5g |
| ブシ末            | 0.5g |
| ゴシツ            | 1.5g |
| シャゼンシ          | 1.5g |

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、D-マンニトール、乳糖水和物、香料を含有します。

## 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元  
松浦薬業株式会社  
名古屋市緑区大高町寅新田36