

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

成分・分量 1日量2包5.4g中 牛車腎気丸エキス4.8g
 ホトアツト…3.0g、シオウウ…5.0g、ゴツツ…3.0g、サンシユコ…3.0g、サンヤク…3.0g、シヤセンシ…3.0g、タクシヤ…3.0g、ツクリヨウ…3.0g、ケイチ…1.0g、フシホ…1.0g
 生薬から抽出した有効成分4.8gを全て配合した適量処方と呼ばれる成分量です。
 添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファミカリン、乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム

保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

4 987174 729011



漢方ラックル®顆粒

眠くならない
 14包7日分
 第2類医薬品



使用上の注意 ■相認すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(4) 今までに薬が強く赤ら顔で体力の充実している人。(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

症状の名称	症状
腸後生熱炎	腸後を上つたり、少し無理をしたと見られると見られる。思わぬ、空っぽ、発熱がみられ、これらが繰り返されたり、持続したりする。
肝臓障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、尿色原、全身のむくみ、食欲不進等があらわれる。

3. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

第2類 医薬品

漢方ラックル®顆粒 販売名:漢方ラックル顆粒

特長

- 腰の痛み・しびれが足の神経にそって、太もも・ふくらはぎ・足にまで広がってしまった腰痛を改善します。
- 体を少し動かしただけで電気が走るようなピリッとする腰痛、イスに長時間座ってられないような腰痛を体の内部から改善します。
- 圧迫されている腰の神経周辺の血液循環を改善させる天然生薬を配合しています。
- 眠くなりません。
- 10種類の生薬から抽出した有効成分を最大量配合した適量処方です。
- 牛車腎気丸と呼称される漢方薬と同一のお薬です。

用法・用量

成人(15歳以上) 1回1包を1日2回朝夕、食前又は食間(食後、2~3時間)にそのまま水かお湯と一緒に服用して下さい。又はお湯に溶かしてかき混ぜてから服用して下さい。1ヵ月程度を目安に服用して下さい。

15歳未満は服用しないで下さい。

用法・用量に関連する注意：用法・用量を厳守して下さい。

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

使用期限

製造番号

製薬販売元
 新生薬品工業株式会社
 奈良県高市郡高取町清水谷1269
 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売
 日本臓器製薬 大阪府中央区平野町4丁目2番3号
 お客様相談窓口 ☎06-6222-0441
 土・日・祝日を除く 9:00~17:00