

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

押して開ける

1.5g×90包(30日分)

第2類医薬品

販売名：牛車腎気丸料エキス顆粒「クラシエ」

成分 成人1日の服用量3包(1包1.5g)中

牛車腎気丸エキス(「症候別治療」、1/2量)…2,400mg

ジオウ2.5g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ポタンピ・ゴシツ・シャ  
ゼンシ各1.5g、ケイヒ0.5g、ブシ末0.25gより抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

(成分に関連する注意)

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

効能

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

用法・用量 1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人(15才以上)……………1回 1包 15才未満7才以上……………1回 2/3包

7才未満4才以上……………1回 1/2包 4才未満2才以上……………1回 1/3包

2才未満……………1回 1/4包

(用法・用量に関連する注意)

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

発売元 クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先

☎0120-149-931

製造

番号

使用

期限

18091

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児

⊗

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3)胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (4)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
  - (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状              |
|------|-----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ       |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛   |
| その他  | 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状   |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください