

ごしゃくさん
五積散料エキス〔細粒〕17

五積散という薬方名は、「五つの積、集積停滞しているものを消散させる」という意味で、気・血・痰・寒・食の五つの病因となるものが体内にうっ積しているのを除いて、それぞれの病を治すという意味から名付けられたものです。

 **・使用上の注意・**

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)

(4)胃腸の弱い人

(5)発汗傾向の著しい人

(6)高齢者

(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

(8)次の症状のある人

排尿困難

(9)次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症：

胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に温湯又は水で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g以下	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

ブクリョウ ……………1.0 g	キキョウ ……………0.5 g
ソウジュツ ……………1.5 g	ショウキョウ ………0.15 g
チンピ ……………1.0 g	カンキョウ ……………0.5 g
ハンゲ ……………1.0 g	ケイヒ ……………0.5 g
トウキ ……………1.0 g	マオウ ……………0.5 g
シャクヤク ……………0.5 g	タイソウ ……………0.5 g
センキュウ ……………0.5 g	カンソウ ……………0.5 g
コウボク ……………0.5 g	ピャクシ ……………0.5 g
キジツ ……………0.5 g	

上記より製した五積散料エキス4.6g(乾燥物換算で約2.3gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、パレイショデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21