

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の五物解毒散料エキス顆粒S

(ごもつげどくさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、本朝経験方による五物解毒散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬(下剤)
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|-------|---------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感、げげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
 - 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

かゆみ、湿疹

【用法・用量】

下記の量を食前又は食間に水又は湯温にて服用して下さい。なお、添付のサジはすり切り約1.0gです。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|
| 大人(15才以上) | 1包または1.50g | 3回 | 7才未満4才以上 | 1/2包または0.75g | 3回 |
| 15才未満7才以上 | 2/3包または1.00g | | 4才未満2才以上 | 1/3包または0.50g | |
| | | | 2才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】 [本品1日量4.5g又は3包(1包1.5g)中]

| | |
|----------------------|---|
| 日本薬局方 センキュウ……………5.0g | 日本薬局方 ダイオウ……………1.0g |
| 局外生規 キンギンカ……………2.0g | 日本薬局方 ケイガイ……………1.5g |
| 日本薬局方 ジュウヤク……………2.0g | より製した水製乾燥エキス……………1.6g |
| | 添加物として、乳糖、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mgを含有する。 |

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に使用すること。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。
- 本剤は、吸湿しやすいので、密閉して保管してください。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社

〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号