

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

押して開ける

漢方製剤 第2類医薬品

販売名:ポーコレン
Urination Pain Medicine

④ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 高齢者
 - 次の症状のある人: むくみ
 - 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢
- 1ヶ月服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度のものの次の諸症: 排尿痛、残尿感、頻尿、尿のにごり

用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	×	服用しないこと

成分・分量 1日量(12錠)中 五淋散料エキス…2.55g

[ブクリョウ 3.0g、トウキ・オウゴン・カンゾウ・ジオウ・タクシャ・モクツウ・カッセキ・シャゼンシ各1.5g、シャクヤク・サンシ各1.0g より抽出]

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守すること
- 吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしかりしめること(3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2〜3時間のことをいいます

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

10232733

MADE IN JAPAN

●11種箱の生薬からなる漢方処方「五淋散」です。●膀胱や尿道などに違和感を感じる方の、排尿痛、残尿感、頻尿などのつらい症状を徐々に緩和していきます。製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせください

あたらしいな
をカタチにする

小林製薬株式会社
お薬相談室
〒582-0029 大阪府箕面市杉野薬生北4-66

0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

小林製薬株式会社
お薬相談室
〒544-0045 大阪市中央区道修町4-40

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしかりしめて保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 本剤をぬれた手で扱わないこと

使用期限
(西暦年/月)

製造番号



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

小林製薬