押して開ける

# 販売名：アルピタン

第2類医薬品

Medicine for Hangover and Headache

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

## ⚠使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症　状 |
|---|---|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 1ヶ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹注）のものには使用しないこと）、暑気あたり、むくみ、頭痛、二日酔

注）「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる） (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

**製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします**


発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒562-0029 大阪府箕面市彩都粟生北4-1-66


MADE IN JAPAN

小林製薬 お客様相談室
**0120-5884-01**
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

紙

漢方製剤

10230979

## 【用法・用量】

大人（15才以上）1回1包、7才以上15才未満1回2/3包、4才以上7才未満1回1/2包、2才以上4才未満1回1/3包、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください（2才未満は服用しないこと）

〈用法・用量に関連する注意〉 (1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 【成分・分量】

1日量（3包：4.5g）中　五苓散エキス……2.3g

〔タクシャ…5.0g、チョレイ…3.0g、ブクリョウ…3.0g、ビャクジュツ…3.0g、ケイヒ…2.0g　より抽出〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する●本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります