



持ち運びしやすい
個包装

- 低気圧などによる複数の不調(頭痛・めまい・むくみ等)を感じる方のためのお薬です
- 漢方処方「五苓散」が、気圧変動による体内バランスの乱れに伴う症状を改善します

特徴

服用タイミング

天気が悪くなったり、
な時、
ど、不調(頭痛・めまい・
くみ等)を感じたりした
ミで服用してください

Medicine for
Low Pressure Disorder
販売名: テイラック

押して開ける

漢方製剤
第2類医薬品

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

① 使用上の注意



相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 1ヶ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたり)に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症: 水様性下痢、急性胃腸炎(しびり腹注)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔注)「しびり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことである **用法・用量** 大人(15才以上)1回4錠、5才以上15才未満1回2錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(5才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守すること (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(12錠) 五苓散エキス 2.3g (タクシャ 5.0g、チョレイ・ブクリョウ・ビャクジュツ 各3.0g、ケイヒ 2.0g より抽出) 添加物として、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、CMC-Ca、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



MADE IN JAPAN
10230957

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するが捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社
〒652-0029 大阪府箕面市杉東東1-44-6

おたらいいな/をカチにす
発売元 小林製薬株式会社
〒544-0045 大阪府中央区道徳町2-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祭日を除く)