

押して開ける

服用に際して、この説明書きを必ず  
お読みください  
また必要なときに読めるよう大切  
に保管してください

使用期限(箱天面及び瓶ラベルに  
記載)を過ぎた製品は服用しないこと

**△ 使用上の注意**

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思  
われる人  
(3) 今までに薬などにより発疹・  
発赤・かゆみ等を起こした  
ことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた  
場合は副作用の可能性がある  
ので、直ちに服用を中止し、この  
箱を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談すること
3. 1ヶ月位(急性胃腸炎、二日酔に  
服用する場合には5~6回、水様  
性下痢、暑気あたりに服用する  
場合には5~6日間)服用しても  
症状がよくならない場合は服用  
を中止し、この箱を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談  
すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

販売名: アルピタンc  
Medicine for Hangover and Headache  
漢方製剤 第2類医薬品

**[効能・効果]**  
体力に関わらず使用でき、のどが  
渴いて尿量が少ないもので、めま  
いはきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみ  
などのいずれかを伴う次の諸症:  
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり  
腹注)のものには使用しないこと)、  
暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔  
(「しぶり腹」とは、残便感があり、  
くり返し腹痛を伴う便意を催すも  
のことである

**[用法・用量]**  
大人(15才以上)1回1本(30mL)、  
1日3回食前又は食間によく振って  
から服用してください  
(15才未満は服用しないこと)

く用法・用量に関する注意)  
定められた用法・用量を厳守する  
こと●本剤は生薬成分を含むた  
め、沈でんを生じることがありま  
すが、薬効には変わりありません  
●食間とは「食事と食事の間」を  
意味し、食後約2~3時間のことをい  
います

\* 食前または食間に  
**頭痛、二日酔**  
体力に関わらず、頭  
痛、はきけ嘔吐等の  
いずれかを伴う方に  
適用

第2類医薬品

30mL

小林製薬

# アルコール などによる 頭痛に

## アルピタンc ドリンク

食べる前などに飲んで  
アルコール代謝力を高める



**[成分・分量]**  
1日量(3本:90mL)中  
五苓散料エキス 81mL  
「タクシャ5.0g、チョレイ3.0g、  
ブクリョウ3.0g、ビャクジュウ  
[3.0g、ケイヒ2.0g]より抽出」  
添加物として、白糖、スクロース、タ  
ウマヂン、ケエン酸、クエン酸Na、安息  
香酸Na、ハラペン、香料、プロピレン  
グリコール、エタノールを含有する  
く保管及び取扱い上の注意>  
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管する  
こと  
(2) 小児の手の届かない所に保管  
すること  
(3) 他の容器に入れ替えないこと  
(誤用の原因になったり品質  
が変わる)  
(4) キャップをあけたら飲みきる  
こと  
製品のお問合せは、お買い求め  
のお店又はお客様相談室にお  
願いいたします

\あつらいいな /をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
小林製薬 お客様相談室  
**0120-5884-01**  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3