

五苓散料エキス〔細粒〕16〔満量〕

⚠️ • 使用上の注意 •

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいづれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

〔効能・効果に関連する注意〕

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことです。

● 用法・用量 ●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〔用法・用量に関連する注意〕

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

● 成分・分量 ●

本品3包(6.0g)中

タクシャ……………5g	ビャクジュツ……………3g
チヨレイ……………3g	ケイヒ……………2g
フクリョウ……………3g	

上記より製した五苓散エキス3.8gを含有する細粒剤です。添加物としてヒプロメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乳糖水和物、バレイショデンプン含有します。



71018935

●**保管及び取扱い上の注意**●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果に変わりありません。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●**お問い合わせ先**●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21