

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

東洋の五苓散料エキス顆粒

(ごれいさんりょう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「傷寒論」「金匱要略」に記載されている五苓散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、水瀉性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：
水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

<効能・効果に関連する注意>

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことである。

[用法・用量]

下記の量を食前又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0g）を使用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1.5g	3回	7才未満 4才以上	0.75g	3回
15才未満 7才以上	1.0g		4才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

[成分・分量] [本品1日量4.5g中]

日本薬局方	タクシャ	2.0g
日本薬局方	チョレイ	1.5g
日本薬局方	ブクリョウ	1.5g
日本薬局方	ビャクジュツ	1.5g
日本薬局方	ケイヒ	1.0g
より製した水製乾燥エキス		1.05g

日本薬局方	タクシャ末	0.60g
日本薬局方	チョレイ末	0.45g
日本薬局方	ブクリョウ末	0.45g
日本薬局方	ビャクジュツ末	0.45g
日本薬局方	ケイヒ末	0.30g
添加物として、部分アルファー化デンプンを含有する。		

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。



[問い合わせ先]

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931

製造販売元

東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号