

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠[大峰]



【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

他の瀉下薬（下剤）

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

軟便、下痢

4. 1カ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】 本品1日量(12錠)中

「日局」サイコ	2.5g	「日局」ニンジン	1.25g
「日局」ハング	2.0g	「日局」ボレイ	1.25g
「日局」ブクリヨウ	1.5g	「日局」ショウキョウ	0.4g
「日局」ケイヒ	1.5g	「日局」ダイオウ	0.5g
「日局」オウゴン	1.25g	「日局」リュウコツ	1.25g
「日局」タイソウ	1.25g		

上記生薬より得た柴胡加竜骨牡蠣湯エキス1950mgを含みます。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルメロースNa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミニナマグネシウム、乳糖を含みます。

【効能・効果】 体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：

高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
(食間とは、食後2~3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満 7歳以上	3錠	
7歳未満 5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

(5) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室

〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号

電話：03（3807）3780

受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販売元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



発売元 伸和製薬株式会社

東京都荒川区南千住5丁目17番8号



製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地