

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

## 第2類医薬品

# さいこかりゅうこつぼれいとう 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒KM

漢方製剤 ～精神不安がある、高血圧の随伴症状や神経症に～ 満量処方

柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒KMは、体力中等度以上で、精神不安がある方の高血圧に伴う動悸や不眠、神経症などに効きます。



### 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）。
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。  
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
軟便、下痢
- 1ヵ月位（小児夜泣き、便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

体力中等度以上で、精神不安があつて、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

## 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
7才以上15才未満	2/3包	
4才以上7才未満	1/2包	
2才以上4才未満	1/3包	
2才未満	1/4包	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

### <用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

## 【成分・分量】

1日量3包（1包2.5g）中

柴胡加竜骨牡蠣湯水製乾燥エキス			3.00g
サイコ	5.0g	ハンゲ	4.0g
ケイヒ	3.0g	オウゴン	2.5g
ニンジン	2.5g	リュウコツ	2.5g
ダイオウ	1.0g	ショウキョウ	0.8g
			より製した乾燥エキス

添加物：乳糖、ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがありますが、薬効には変わりありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。  
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55  
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）