

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

## ウチダの 柴胡桂枝乾姜湯

サイコケイシカンキョウトウ

ウチダの柴胡桂枝乾姜湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異なおいがあります。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
むくみ  
(6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等が見られ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（かぜの後期の症状に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、不眠症、神経症。

## ＜効能・効果に関連する注意＞

注「血の道症<sup>ちのみちしやう</sup>」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

## 用法・用量

年齢	1日量
大人（15才以上）	本品1包を袋入りのまま、水約500mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食前又は食間に服用する。
15才未満7才以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前又は食間に服用する。
7才未満4才以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前又は食間に服用する。
4才未満	服用しないこと。

## ＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本品1袋（1日分）中			
サイコ	6g	ボレイ	3g
ケイヒ	3g	カンキョウ	2g
カロコン	3g	カンゾウ	2g
オウゴン	3g		
		合計	22g

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3