

第2類医薬品



漢方煎専科

柴胡桂枝乾姜湯

11

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

2015年4月(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

漢方薬 柴胡桂枝乾姜湯「タキザワ」

16D

⚠<使用上の注意>



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人
 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがかかる・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(かぜの後期の症状に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 【成分・分量】 | | | |
|---------|-------------|----------------|-------|
| サイコ | 6.0g ショウキョウ | 3.0g | |
| ケイヒ | 3.0g カンゾウ | 2.0g | |
| オウゴン | 3.0g カロコン | 4.0g | |
| ボレイ | 3.0g | | |
| | | 1日分(1包12.0g×2) | 24.0g |

【効能・効果】
体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神経過敏で、動悸、息切れ、ときにはあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症:更年期障害、血の道症(注)、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎

【効能・効果に関する注意】

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】
1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいため煎じめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

| 年 齢 | 1回量 |
|-----------|---------|
| 大人(15歳以上) | 全量 |
| 15歳未満7歳以上 | 大人の2/3 |
| 7歳未満4歳以上 | 大人の1/2 |
| 4歳未満 | 服用しないこと |

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180148



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 048-688-7923
受付時間:9時~18時(月~金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

0120-149-931

