

⚠ 使用上の注意 ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 高齢者、(4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人、(5) 次の症状のある人、むくみ (6) 次の診断を受けた人、高血圧、心臓病、腎臓病
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 【皮膚】発疹・発赤・かゆみ
 【その他】頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
 【間質性肺炎】階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切がる・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
 【偽アルドステロン症、ミオパチー】手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、腹力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
 【肝機能障害】発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
 3. 1ヵ月位（かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

使用期限

ガラス:瓶

金属:キャップ

30mL
かぜの中期～後期の症状に
SKコール 内服液
柴胡桂枝湯

微 熱
頭 痛
は き け
胃 腸 炎



発売元

製造販売元

日邦薬品工業株式会社
東京都涉谷区代々木3-46-16

大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森越1-17-15

[成分・分量] 1日量90mL(30mL×3本)中
 柴胡桂枝湯濃縮液…45mL
 サイコ5g、ハンゲ4g、ケイヒ2.5g、シャクヤク2g、オウゴン2g、ニンジン2g、タイソウ2g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ1g
 添加物としてバラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、ハチミツを含有します。

[効能] 体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

[用法・用量] 成人(15歳以上)1回1本、1日3回 食間に服用してください。本剤は沈殿を生じることがありますので、よく振りませてから服用してください。

(用法・用量に関する注意) (1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は小児(15歳未満)には服用させないでください。

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない、温氣の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(5)本剤は1回1本を飲みきりとし、分割服用はしないでください。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931 A6

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社
03(3370)7174(代)

4 976084 056300