

漢方薬

オオクサ柴胡桂枝湯エキス顆粒(分包)

特徴

- こじれた“かぜ”はなかなか治りにくいものです。寒けがしたり、微熱や寝汗があったり、頭痛や上半身の痛みがとれず、食欲がなく、胸や脇にかけて重苦しいなど、いつまでもスッキリしません。
- 漢方薬「柴胡桂枝湯」(さいこけいしとう)は、このような症状に大変効果のある薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：

胃腸炎、かぜの中期から後期の症状



腹痛を伴うかぜ



微熱のある長びくかぜ

用法・用量

次の量を、食前又は食間に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上7歳未満	1/2包	
2歳以上4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

成人の1日服用量3包(7.5g)中、次の成分及び分量からなる柴胡桂枝湯エキス(2/3量)3500mgを含んでいます。

成分	分量
サイコ(柴胡)	3.33g
ハンゲ(半夏)	2.67g
ケイヒ(桂皮)	1.67g
シャクヤク(芍薬)	1.33g
オウゴン(黄芩)	1.33g
ニンジン(人参)	1.33g
タイソウ(大棗)	1.33g
カンゾウ(甘草)	1.00g
ショウキョウ(生姜)	0.67g

添加物としてバレイショデンプン、乳糖、無水ケイ酸、白糖、カルメロースCaを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



その他の注意

- (1) 天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なることがあります。効果に変わりはありません。

包装 9包

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

大草薬品株式会社 「お客様相談係」

電話：046-834-1193〔月～金曜日 9：00～17：00(祝日を除く)〕

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15